

Otrivina®
Clorhidrato de
Xilometazolina
0,1%

Spray Nasal
Con dosis medida

Venta Libre

Industria Suiza

Lea detenidamente este prospecto antes de usar Otrivina®. Consérvelo por si necesita volver a leerlo. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene cualquier pregunta.

1. ¿Qué contiene Otrivina®?

Cada mL contiene 1 mg de clorhidrato de xilometazolina. Excipientes: (cloruro de benzalconio, edetato disódico, fosfato disódico dodecahidratado, fosfato de sodio dihidratado, cloruro de sodio, sorbitol 70%, metilhidroxipropilcelulosa y agua purificada) c.s.

PROPIEDADES / USO TERAPÉUTICO

Otrivina® es un descongestivo tópico de la mucosa nasal y rinofaríngea. Por su formulación, posee componentes que ayudan a prevenir la sequedad e irritación de las vías nasales.

2. ¿Para qué sirve Otrivina®?

Otrivina® descongestiona la nariz que se encuentra temporalmente tapada a causa de resfrios, gripe, ninitis alérgica, sinusitis. El efecto de Otrivina® inicia a los pocos minutos y puede durar hasta 10 horas.

DOSIS / MODO DE EMPLEO

3. ¿Cómo debe ser usado Otrivina®?

Otrivina® 0,1% spray con dosis medida: Adultos 3 a 4 veces al día 1 aplicación con dosis medida en cada orificio nasal.

Instrucciones especiales de empleo:

1. Antes de la primera aplicación, se presiona varias veces hasta obtener una nebulización uniforme. El spray dosificador estará listo para utilizarse inmediatamente en las siguientes aplicaciones.
2. Suéñese la nariz.
3. Inclínese ligeramente hacia adelante e introduzca el aplicador en el orificio nasal.
4. Presione una vez e inhale al mismo tiempo.
5. Repita el procedimiento en el otro orificio nasal.
6. Colocar la tapa inmediatamente después de utilizar. El spray con dosis medida permite una dosis exacta y asegura que la solución sea bien distribuida sobre la superficie de la mucosa nasal.

quier otra reacción que cree puede ser provocada por Otrivina®.

INTERACCIONES

10. ¿Está tomando otros medicamentos?

Consulte a su médico o su farmacéutico si se encuentra tomando medicación antidepresiva o cualquier otro medicamento.

COMENTARIOS ESPECIALES

11. ¿Cómo tiene que almacenar Otrivina®?

Vida útil 36 meses: conservar a temperatura menor a 30 °C.

No utilice después de la fecha de caducidad que se indica en la caja.

12. ¿Qué debo hacer si ingiero una cantidad excesiva de Otrivina®?

En caso de ingestión accidental, consulte a su médico inmediatamente.

Sobredosificación:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez:
T.E. (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital Prof. A. Posadas:
T.E. (011) 4654-6648 / 4658-7777

4. ¿Qué debo hacer si olvido aplicar una dosis?

Si olvida aplicar una dosis y se acuerda aproximadamente 1 hora después, entonces aplíquela inmediatamente. Sin embargo si ha pasado más tiempo entonces pásela por alto y espere hasta la siguiente dosis.

CONTRAINDICACIONES

5. ¿Cuándo no debe utilizarse Otrivina®?

Si es alérgico y/o hipersensible a cualquiera de los ingredientes enumerados en la sección "¿Qué contiene Otrivina®?".

Si recientemente ha pasado por una cirugía transnasal. Niños.

PRECAUCIONES

6. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se usa Otrivina®?

Consulte con su médico o farmacéutico antes de utilizar Otrivina® si padece presión arterial alta, enfermedad del corazón, hipertiroidismo, glaucoma o diabetes. O si está tomando medicamentos antidepresivos. Como con otros descongestivos nasales, Otrivina® puede causar, en pacientes muy sensibles, insomnio, mareos, temblores. Consulte a su médico si dichos síntomas le causan problemas.

Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos u operar maquinaria: Ninguno.

EMBARAZO / LACTANCIA

7. ¿Puedo utilizar Otrivina® durante el embarazo o mientras estoy en periodo de lactancia?

Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de usar este medicamento.

PACIENTES DE EDAD AVANZADA

8. ¿Puede ser usado Otrivina® en los pacientes de edad avanzada?

Otrivina® puede ser utilizado en pacientes de edad avanzada. Además de las precauciones generales de uso, es necesario no exceder la dosis recomendada.

REACCIONES SECUNDARIAS

9. ¿Qué reacciones secundarias o adversas puede causar Otrivina®?

Como con todos los medicamentos pueden ocurrir efectos adversos en algunas personas.

Los siguientes efectos adversos son muy raros. Deje de utilizar Otrivina® y consulte con su médico inmediatamente si alguno de estos síntomas ocurren: reacciones alérgicas (rash, picazón o comezón), visión borrosa, palpitaciones irregulares o rápidas.

Otros efectos más leves pueden aparecer ocasionalmente: sensación de ardor local, irritación o sequedad de la mucosa nasal, náuseas y dolor de cabeza.

alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Frasco dosificador con 10 ml

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 24.664

Elaborado en

Route de l'Etraz CH-1260-Nyon, Suiza.

GlaxoSmithKline Argentina S.A.

Carlos Casares 3690, B1644BCD, Victoria, Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: Eduardo D. Camino-Farmacéutico.

Línea de atención al consumidor: 0800-888-6006

o escribanos a infomedica.consumo@gsk.com

Última revisión: Diciembre 2003

® Marca Registrada

AR 937847 - 151786

